



Profium Dipirona

Comprimidos - Inyectable

Industria Argentina

Venta bajo receta

FÓRMULA:

PROFIUM COMPRIMIDOS

Cada comprimido contiene:

Dipirona	500 mg
Excipientes c.s.p.	600 mg

PROFIUM INYECTABLE

Cada ampolla contiene:

	1 g	2 g	2,5 g
Dipirona	1 g	2 g	2,5 g
Bisulfito de sodio, Agua destilada c.s.p.	2 mL	4 mL	5 mL

ACCION TERAPÉUTICA:

Analgésico. Antipirético.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Se adaptará al criterio médico.

Como orientación se aconseja:

Adultos y adolescentes a partir de 15 años.

Comprimidos: 1 a 2 comprimidos 2 a 4 veces al día.

Inyectable: 1 a 2 ampollas diarias por vía intramuscular o endovenosa.

La inyección endovenosa debe administrarse lentamente, no más de 1 mL por minuto, con el paciente acostado y controlando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración pues puede producirse una caída tensional por una administración demasiado rápida.

Es conveniente entibiar la solución previa a su inyección.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a las pirazonas y sus derivados. Insuficiencia grave hepática o renal. Discrasias sanguíneas. Úlcera gastroduodenal en actividad. Deficiencia congénita de glucosa-6-fosfato dehidrogenasa.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA:

Usar con precaución en pacientes que sufran de alteraciones en el sistema hematopoyético, asma bronquial, infecciones crónicas de las vías respiratorias, intolerancia al alcohol o hipersensibilidad a otras sustancias. Durante el embarazo, en lactantes y en niños pequeños debe ser utilizado bajo supervisión médica. Ocasionalmente puede provocar una coloración roja en la orina, lo que es normal e inofensivo.

ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS:

Raramente pueden presentarse fenómenos de hipersensibilidad, los cuales son muy peligrosos. Los más importantes son shock anafiláctico y agranulocitosis.

En caso de observarse síntomas de shock (sudor frío, mareos, estupor, disnea, sensación de opresión en el pecho, descenso crítico de la presión arterial) se debe requerir inmediata asistencia médica.

Los síntomas de agranulocitosis son fiebre alta, escalofríos, dolor de garganta, molestias de la deglución, inflamación en la región de la boca, nariz, garganta y anogenital; un aumento de la eritrosedimentación y una gran reducción de los granulocitos.

Ambas reacciones de hipersensibilidad pueden presentarse inclusive en pacientes sin antecedentes y desde el mismo momento de la administración vía oral o inyectable hasta una hora después.

Cuando se observen uno o varios de estos síntomas es prioritario suspender la medicación y solicitar asistencia médica.

Aisladamente se han detectado trastornos renales, erupción cutánea y ataques de asma.

ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMO:

No es conveniente el consumo simultáneo de alcohol con dipirona porque pueden influenciarse sus efectos mutuamente.

Profium puede disminuir los niveles sanguíneos de ciclosporina.

SOBREDOSIS:

En caso de sobredosis es siempre conveniente la asistencia médica. Se debe realizar tratamiento sintomático. En pacientes que no estén inconscientes se debe intentar provocar el vómito.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital mas cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología de:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/658-7777

PRESENTACIÓN:

Comprimidos: Envases con 20 y 50 comprimidos

Envases hospitalarios con 500 y 1000 comprimidos

Inyectable: Envases con 5 ampollas

Envases hospitalarios de 50 y 100 ampollas

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 37.887

CONSERVAR A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30 °C, AL ABRIGO DE LA LUZ, Y EN SU ENVASE ORIGINAL.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Laboratorios Duncan S. A.

Tronador 543 (C1427CRK) - CABA

Comprimidos elaborados en:

Tronador 229/41/55 (C1427CRE) - CABA y/o

Galicía 2652 (1416DHR) - CABA

Inyectable elaborado en:

José Cubas 2673/75 (C1419GMK) - CABA

Directora Técnica: SILVIA SALLAGO - Farmacéutica