



Rupegen 0,1 g %

Gentamicina (como sulfato) 0,1g %

Crema

Industria Argentina

Venta bajo receta archivada

Fórmula

Cada 100 g contienen:

Gentamicina (como sulfato) 100 mg
Excipientes csp. 100 g

Acción Terapéutica:

Antibiótico aminoglucósido de amplio espectro que posibilita tratamientos tópicos altamente efectivos en infecciones bacterianas primarias y secundarias de piel.

Gentamicina puede ser efectiva en infecciones que no han respondido a otros antibióticos tópicos.

Bacterias susceptibles a la acción de gentamicina incluyen cepas sensibles de estreptococos (grupo A beta-hemolítico, alfa-hemolítico), Staphylococcus aureus (coagulasa-positivos, coagulasa-negativos y algunas cepas productoras de penicilinas) y bacteria gram-negativas: Pseudomona aeruginosa.

Indicaciones:

Infecciones primarias de piel: Impétigo contagioso, foliculitis, ectima, forunculosis.

Infecciones secundarias de piel: acné pustular, psoriasis pustular, dermatitis seborreica infectada, dermatitis por contacto, excoriaciones infectadas.

Nota: Gentamicina es un agente bactericida que no es efectivo contra infecciones virales o fúngicas de piel.

Dosis y Administración:

Aplicar una pequeña cantidad de RUPEGEN crema para cubrir el área afectada, 3 a 4 veces al día. Si se prefiere, cubrir el área tratada con un vendaje.

En impetigo contagioso, las costras deberían ser removidas antes de la aplicación de RUPEGEN crema para permitir el máximo contacto entre el antibiótico y la infección.

Contraindicaciones:

Este medicamento esta contraindicado en individuos con una historia de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la crema.

Reacciones Adversas:

En pacientes con dermatosis tratados con gentamicina, se han reportados raros casos de irritación (eritema y prurito) que generalmente no requirieron la discontinuación del tratamiento.

Precauciones:

El uso tópico de antibióticos permite a veces el crecimiento de organismos no sensibles, especialmente de hongos. Si esto ocurriera, o si hubiera signos de irritación local, o fenómenos de sensibilización, se aconseja suspender el tratamiento e instituir la terapéutica apropiada.

Sobredosis:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Presentaciones:

Estuches conteniendo 1 pomo con 15 ó 30 gramos de crema; envases hospitalarios con 50 pomos de 15 ó 30 gramos de crema.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 37.451

CONSERVAR ENTRE 2 °C y 30 °C, EN LUGAR SECO, AL ABRIGO DE LA LUZ Y EN SU ENVASE ORIGINAL.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Laboratorios DUNCAN S.A.

Tronador 543 (C1427CRK) - CABA

Directora Técnica: Adriana Pérez - Farmacéutica

Elaborado en : Coronel Méndez 440 (B1875DQJ) - Wilde - Prov. de Buenos Aires

y/o Arenales 259 - Ramos Mejía - Prov. de Buenos Aires

COD. P-5-106-21