Laboratorios DUNCAN

Solución Clorurada Hipertonica al 20% Bioquim

Solución Clorurada Hipertonica

Inyectable

Industria Argentina **Venta bajo receta**

Fórmula:
Cada ampolla contiene:
Cloruro de sodio ..... 2,0 g
Agua para inyectables c.s.p. ..... 10 ml

Cada ampolla contiene:
Cloruro de sodio ..... 4,0 g
Agua para inyectables c.s.p. ..... 20 ml

Acción terapéutica:
Restaurador de sodio por vía parenteral.

Indicaciones:
El cloruro de sodio esta indicado en el tratamiento de depleción de volumen extracelular, deshidratación y depleción sódica la cual puede ocurrir por ejemplo luego de una excesiva diuresis, gastroenteritis o restricción de sal.
Solución clorurada hipertónica ha sido utilizada en situaciones de emergencia de extrema depleción sódica.

Posología:
La concentración y dosificación de soluciones de cloruro de sodio para uso intravenoso están determinadas por varios factores incluyendo la edad, peso y condición clínica del paciente.
Como orientación se aconseja: 1 a 4 ampollas de 10 ml o 1 a 2 ampollas de 20 ml por día.
En niños: 1 a 2 ampollas de 10 ml por día.
Administración I.V. diluida en la solución que determine el médico.

Reacciones adversas:
Envenenamiento con cloruro de sodio ha resultado de inducción no exitosa de émesis, o lavado gástrico con solución salina hipertónica. La administración excesiva de cloruro de sodio causa hipernatremia, el efecto adverso más serio del cual la deshidratación de órganos internos, especialmente el cerebro puede conducir a trombosis y hemorragia.
Los efectos adversos generales de cloruro de sodio incluyen nauseas, vómitos diarrea calambres abdominales, sed, salivación reducida y sudor, fiebre, hipotensión, taquicardia, insuficiencia renal, edema pulmonar, paro respiratorio, dolor de cabeza, mareos, debilidad, irritabilidad, rigidez muscular, convulsiones y coma.

Precauciones:
El cloruro de sodio debería ser administrado con precaución a pacientes con insuficiencia cardíaca, edema periférico o pulmonar, insuficiencia renal o preeclampsia.
Se debe tener cuidado al administrar cloruro de sodio intravenoso en pacientes muy jóvenes o edad avanzada

Contraindicaciones:
Soluciones salinas no deberían ser administradas para inducir émesis.

Sobredosificación:
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez :
Sánchez de Bustamante 1399 CABA - Tel.: (011) 4962-2247 / 6666
Hospital A. Posadas: (011) 4658-7777 / 4654-6648

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 36503

CONSERVAR A MENOS DE 30º C EN LUGAR SECO, AL ABRIGO DE LA LUZ Y EN SU ENVASE ORIGINAL.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Laboratorios DUNCAN S.A.
Tronador 543 (C1427 CRK) - CABA
Elaborado en: José Cubas 2673/75 (C1419GNK) - CABA
Dirección Técnica: SILVIA SALLAGO - Farmacéutica.

COD P-4-139-24